

KIŚCIEC TAJWAŃSKI

„Lophura Swinhoii”

Bażant swinhoe, należy do rodziny kiśców. Inna jego nazwa to kiściec tajwański. Gatunek ten w naturze zamieszkuje tereny Tajwanu. W obrębie tego gatunku nie wyróżnia się podgatunków. Ptaki te są bardzo odporne tak na niskie, jak i wysokie temperatury. Nie wymagają dużych woliery. Młode osobniki są z natury płuche i nerwowe, ale ich charakter zmienia się z biegiem czasu. Całkowita zmiana zachowania następuje w czasie sezonu lęgowego. Samce wówczas stają się zadziorne i prowokują starcia z innymi kogutami mieszkającymi w sąsiednich wolierych. Zdarza się, że kogut w czasie sezonu lęgowego jest natarczywy, a nawet agresywny w stosunku do kury. Ma to związek zazwyczaj z za małą wolieryą i młodym wiekiem koguta. Rozwiązaniem może być zwiększenie woliery lub dołączenie do takiego koguta więcej niż jednej kury. Dojrzałość samice osiągają już w pierwszym roku życia i prawie wszystkie niosą jajka. Tylko samice z bardzo późnych lęgów mogą nie znosić jajek. Koguty mogą być płodne również już w pierwszym roku życia, ale najczęściej dotyczy to kogutów z wczesnych lęgów, dobrze już wykolorowanych. Koguty z lęgów wczesnych następnej wiosny mogą już mieć szatę godową dorosłych samców, jedynie bez białego czuba i białych piór w ogonie.



Dorosły samiec kiśca tajwańskiego. Fot. Jacek Zaborowski.

Tokowanie kogutów tego gatunku jest identyczne jak kiśców srebrzystych. Dwuletnia i starsza samica pierwsze jajka znieść może już w końcu marca. Takie zniesienie zazwyczaj narażone jest na zniszczenie przez przymrozki. Z moich obserwacji wynika, iż samice znoszą jajka zazwyczaj późnym popołudniem. Im dzień jest dłuższy, tym później znosi jajka. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest zbieranie jajek przed wieczorem i przeznaczanie ich do sztucznej inkubacji. Zdarza się dość często, że samce, a nawet samice niszczą jajka. Przyczyna takich zachowań może być wiele powodów i określenie ich możliwe jest tylko po bezpośredniej obserwacji ptaków. Istnieje jednak dobra metoda na zapobieganie takim zachowaniom. Należy zbudować w woliery kryjówki dla samicy. Kryjówki powinny być tak zbudowane (mogą to być budki) by wewnątrz było ciemno, a wejście było niewielkie. W kryjówce wykładamy warstwę słomy (dość grubą). Samica po zniesieniu jajek zazwyczaj przykrywa je słomą. W ten sposób jajka zabezpieczone są przed rozdziobaniem oraz częściowo przed przemrożeniem. Ukrywanie jajek jest zachowaniem instynktownym. Obserwowałem je również u innych kiśców, jak i u uszaków i ma to swoje uzasadnienie (może o tym napisze w innym wątku).

Wczesne zniesienia mogą być również niezależne, gdyż samce gdy jest zimno jeszcze niezbyt intensywnie kryją. Aby przyspieszyć toki samców, woliery powinny być dobrze osłonięte od wiatru i być dobrze oświetlone przez cały dzień. Najlepsza jest wystawa południowo-wschodnia.



Samica kiśca tajwańskiego wysiadująca jaja. Fot Jacek Zaborowski.

Samice mogą w sezonie znieść około 30 jajek. Niosą zazwyczaj w kilku seriach po około 8 jajek, po czym mają kilkudniową przerwę. Jajka znoszą co drugi dzień. Wysiadywanie jajek trwa 24-26 dni. Jajka swinhoe są mniejsze niż kiśca srebrzystego i są nieco ciemniejsze. Białe nakrapiania skoncentrowane są na końcówkach jajek. Młode lęgną się praktycznie w ciągu kilku godzin. Odchów młodych nie sprawia większych problemów. Pisklaki rosną szybko i po kilku dniach mogą już fruwać. Do ochowy najlepiej nadaje się pełnoporcjowa karma granulowana, uzupełniana o zielonki i białko zwierzęce. Pisklaki chętnie ją pobierają. Nie zaobserwowałem u swoich swinhoe agresji względem innych młodych bażantów(odchowywane były z innymi kiścami). Dobrze jest by w pomieszczeniu z pisklakami znajdowały się jakieś gałęzie, po których mogły by chodzić oraz kryjówki. Dobrze jest też na tacach wstawiać kawałki czystej darnii. Takie odchów stymuluje rozwój piskląt, mają dużo ciekawych zajęć i nie nudzą się.

U ośmio tygodniowych pisklaków można już na 100% określić płeć.

Częściowe pierzenie młodych kogutów zaczyna się już latem.

Dorośle kiśce swinhoe karmi się mieszankom ziaren, zielonki i owoce nie są zbyt chętnie pobierane, ale należy je również podawać. W wolierze ptaki powinny mieć grit. Ptaki lubią zażywać kąpiele piaskowych, więc dobrze by miały do dyspozycji suchy piasek